

病虫情报

第 8 期

重庆市南川区农村发展服务中心

2025 年 7 月 10 日

“两迁”害虫和纹枯病发生与防治

一、发生情况

据我中心 7 月 10 日前在兴隆、东城、西城、鸣玉、水江等镇（街道）田间普查，白背飞虱百丛虫量 180—5300 头，平均 1156 头，是去年同期的 0.31 倍。褐飞虱田间未见。稻纵卷叶螟田间卷叶率为 0—3.1%，平均 0.3%；田间赶蛾 0—120 头 / 亩，平均 30 头 / 亩，是去年同期的 0.63 倍。稻纹枯病病株率 0—18%，平均 6.0%，比去年同期高 1.7 个百分点，正处于病情发生蔓延关键期。由于今年 6 月下旬至 7 月上旬雨水偏多，田间湿度大，较有利于“两迁”害虫的迁入繁殖和纹枯病的发生危害。因此，希各乡镇（街道）产业发展中心，加强田间检查，科学指导防治“两迁”害虫和稻纹枯病，挑治叶瘟的危害。

二、防治时间

防治时间为7月15—22日，兼治二代螟虫，800米以上可推迟3—5天。

三、防治方法

1. 亩用25%噻嗪酮50克或20%氯噻啉可湿粉剂20克+40%稻瘟·已唑醇50克，防治稻飞虱及纹枯病的危害。

2. 亩用70%吡虫啉6克+30%苯醚甲环唑·丙环唑12毫升+40%甲氧·茚虫威15克，主治稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻纹枯病，兼治其他病虫。

在有稻瘟病发生的田块，可亩用75%三环唑30克或40%稻瘟灵150克进行防治。

以上配方，兑水60kg常规喷雾或加水7—10kg机动喷雾，加农药减量助剂，效果更好。在采取“无人机”防治时，要留足鱼塘和蜜蜂的安全距离，防止造成药害事故。