

病虫情报

第 10 期

重庆市南川区农村发展服务中心

2025 年 8 月 6 日

加强穗颈瘟的防治

据我中心大面积调查，今年我区叶瘟发生较普遍，在大观、兴隆、河图等乡镇部分品种已经发生了穗颈瘟，病株率 0—1.6%，平均 0.3%，个别品种在大观试验基地发生较重。据气象预报，8 月降雨天气较多，加之中山以上地区早晚雾露较大，有利于穗颈稻瘟的发生蔓延，且与我区水稻抽穗扬花至灌浆结实期相吻合，穗颈稻瘟存在较大风险。因此，希望各乡镇（街道）产业发展服务中心要落实专人，加强田间检查，及时指导农户（尤其是专业合作社、种植大户），防治穗颈稻瘟。

一、防治重点

以稻瘟病常发区的两系稻等感病品种、叶瘟发生重的田块、偏施氮肥田块、一类苗田块、特别是连片种植同一品种区域的田

块为防治重点，特别是中高山地区，在水稻破口初期和齐穗期抢晴天各施药防治一次，可有效预防穗颈稻瘟。

二、防治办法

1.亩用 75%三环唑可湿性粉剂 25 克+40%富士一号 100 毫升；

2.亩用 75%三环唑可湿性粉剂 25 克+40%苯甲·嘧菌酯 16 克或 20%烯肟·戊唑醇悬浮剂 25 克。

以上药剂任选一种兑水 45—60 公斤常规喷雾或兑水 10 公斤机动喷雾。

特别提醒：预防穗颈瘟，禁用三环唑类复配制剂。